

Földközi-tengeri gyümölcslégy (narancslégy) - *Ceratitis capitata* Wiedeman (csak hímeket fogó csalétek)

A hím 4 mm hosszú. Feje okkersárga, az első ortiális sörte feltűnően meghosszabbodott és vége lapátszerűen kiszélesedett. A tor háti részén csillogó fekete pöttyök vagy vonalak vannak, a lábak sárgák, a szárnyak alapi cellái szürke pöttyösek, a szárny egyébként áttetsző, keresztsávokkal és barnásfekete pöttyökkel.



agspsrv34.agric.wa.gov.au

A légy, amit a csapda fog

Tápnövénye: citrus-félék, kajszi, őszibarack, körte, alma, cseresznye, szilva, szamóca, szőlő, olajfa, banán, paradicsom, kávé, kaktusz (*Opuntia*), ördögcérna (*Lycium hamilifolium*), golgotavirág (*Passiflora*). Kárképe: a fertőzött gyümölcsön a tojásrakás helyén elszíneződött folt jelentkezik, ami kezdetben kúpos, majd bemélyed. Az őszibarack rohadni kezd, a mag körül megbarnul, a gyümölcs puha tapintásúvá válik, majd lehullik.

A csalogatóanyag csapdát a növényzetre helyezünk ki, 1-1,5 m-es magasságba, lombos ágra akasztva. A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja hazánkban május eleje, (ill. amikor a kártevő behurcolása, pl. nagy déligyümölcs-szállítmánnyal várható.) Hazánkban egészen novemberig megjelenhet!



A CSALOMON® csapda szelektivitása: a csapda hatóanyaga CSAK a földközi tengeri gyümölcslégy HÍMJEIT fogja; eddigi hazai kísérleteink tanúsága szerint semmilyen más rovat nem csalogat.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdában a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!

A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk

A varsás **VARs+** csapda érzékeny detektáláshoz alkalmazható; továbbá a populáció mennyiségi változásait (rajzásmenetét) jól követi, tömeges fogásra is alkalmas [4]. A megfelelő hatékonysághoz **feltétlenül szükséges** valamilyen szabadforgalmú inszekticid elhelyezése - mind a **felső**, mind az alsó fogó-edényekben!

Csapdáinkkal kiválóan megállapíthatjuk a legyek **megjelenését** és követhetjük a **rajzásmenetét**. Ha behurcolásának lehetősége felmerül, ajánlatos a szállított citrusfélét alaposan átvizsgálni. Szállítás közben hidegkezeléssel (12 nap / 1,1 °C) védekezhetünk, illetve bizonyos gyümölcsöknél forró gőzöléssel (8 órán át 44°C), vagy forró vízbe való merítéssel[1,2]. Hazánkban karantén kártevő [3]!

[1]USDA Treatment Manual, USDA/APHIS, USA, Frrederick, 1994. [2]Smith és mtsai, Quarantine Pests for Europe. CAB International, Wallingford, 1997. [3]Karantén és veszélyes növényi károsítók diagnosztikai kézikönyve. IV. Kötet. Budapest Fővárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás, Budapest, 1996. [1]
[4] Tóth et al, Növényvédelem 40:179-183, (2004)



az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.




Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>

A KLP+, VARs+ és VARb3z+ csapdatípusoknál **feltétlenül szükséges** a csapdába bemászó rovarokat előlni. Külföldi tapasztalatok szerint jól bevált például, ha a csapda belsejét alaposan befújják háztartási rovarölő spray-jel (pl. empetrin, permetrin, deltametrin, stb. hatóanyaggal), és ezt a befújást 8-10 naponta megismétlik.

Ezekhez a csapdatípusainkhoz **alternatívaként** mellékelten küldünk **hengeres ragacs betétet** is, azoknak, akik számára valamilyen okból az ölöszeret használata kényelmetlen.




Összeszerelési útmutató Hengeres ragacsbetéthez



1. Válassza szét a ragacslap párt (A)!
- 2-4. A tartó gyűrűbe (B) helyezze be a ragacslapot, úgy, hogy a **RAGASZTÓS FELÜLET BEFELE** nézzen!
5. Helyezze a kész hengeres ragacsbetétet a csapda mindkét fogóedényébe!
6. A felső fogóedény esetében helyezze rá a műanyag kúpot és állítsa össze a csapdát a szokásos módon!



© MTA NKI 2010



Csapdaválasztékunkból a CSALOMON® VARs+ csapda mutatkozott legérzékenyebbnek a légy fogására [4]