

Repcebecő-, repceszár- és nagy repceormányos (*Ceutorhynchus assimilis* Paykull, *C. quadridens* Panzer, *C. napi* Gyllenhal)

A kifejlett bogarak 2,2-4 mm hosszúak, tojásdad alakúak, tompán szürkésfehér illetve ólomszürke színűek. Ormányuk hosszú, keskeny, a testükkel nagyjából derékszöget bezáró irányultságú. A fajok elkülönítéséhez rovartaxonómiai ismeretek szükségesek. Petéik fehérek, és a levélnyelbe, szárba, illetve a becőbe (*C. assimilis*) fúrt üregben találhatóak. Lárvaik tejfehérek, ill. enyhén sárgásak, míg a fejtök sötétebb. Bábjuk a talajban földbölcsőben található, 2,5-4,5 mm hosszú, világos színű szabadbáb.



biolib.cz

Repceszár-ormányos (*C. quadridens*), amit a csapda fog

A lárva (*C. quadridens*-fent, *C. napi*-lent) és kártétele, amit meg kell előznünk



Tápnövényeik: a keresztes-virágú növények, repce, káposztafélék (pl.: karfiol, karalábé, fejeskáposzta, stb.), fehér mustár, retek, karalábé, stb.

Kárképük: fő kártételük, hogy a becőben (*C. assimilis*), a levélnyelben és a repceszár belsejében (*C. quadridens*, *napi*) fejlődnek lárvaik, de az imágók is károsíthatnak a virágok furkálásával illetve kis mértékben a hámozgatással. A károsodott becő jelentős termésveszteség mellett korábban érik, kovad, magtermése pereg. A károsodott szár belseje szivacsos állományúvá válik, felreped, a növény lankad, a fejlődésben visszamarad.




A csapdát az áttelelő hely (vagyis a TAVALYI repcetábla gyomszegélyébe, vagy az azt szegélyező bokorsor mellé), karóhoz rögzítve helyezzük ki úgy, hogy a lelógó sárga bemászólap alsó sarka a talajjal érintkezzen (a lapot egy sátorcövekkel – drótdarabbal a talajhoz is célszerű rögzíteni). A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja március eleje.

A CSALOMON® csapda **szelektivitása**: a csapda csalétke a 3 repceormányos fajon (*C. assimilis*, *C. quadridens*, *C. napi*.) kívül csupán bizonyos mértékig egyes káposztabolha fajokat (*Phyllotreta* spp.), illetve kisebb számban a káposztalegyet (*Delia radicum*) csalogatja. (A káposztabolhák fogására célzott, hatékonyabb csapdakészítmény szerepel termékeink között!). A KLP+ csapdában kis számban előforduló más bogarak, legyek, stb. véletlenszerűen kerülnek a csapdába.

A CSALOMON® csapda **vonzóképessége**: környezeti viszonyoktól függően 3-4 hét. Ezután a csapdában a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! A KLP+ "kalap" csapda érzékeny detektáláshoz alkalmazható; továbbá a populáció mennyiségi változásait (rajzásmenetét) is jól követi, tömeges fogásra is alkalmas. A megfelelő fogáshoz **feltétlenül szükséges** a csapda átlátszó fogóedényébe rovarölőszert tenni, amely a csapdába bemászó bogarakat néhány perc alatt elpusztítja.

A csapda csalétke mind a hím, mind a nőstény ormányosokat csalogatja. Csapdánk kiválóan alkalmas a kora tavasszal megjelenő, áttelelt bogarak első feltűnésének észlelésére, rajzásuk nyomon követésére. Leghatékonyabban azon a helyen működik, ahol a bogarak az előző évről nagy számban telelnek (tehát az **ELŐZŐ** évi repcetábla közelében). Ha itt jelzik a csapdák az ormányosok előbújását, biztosak lehetünk benne, hogy 1-2 napon belül megkezdődik bevonulásuk az idei táblákba. A repcebecő-ormányos esetében a nyár második felében megjelenő következő generáció nagyságának felmérésére is alkalmazható a csapda.





A az ATK Növényvédelmi Intézete bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30/9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: csalomon@atk.hu internet: <www.csalomoncsapdak.hu>.

A KLP+, VARs+ és VARb3z+ csapdatípusoknál **feltétlenül szükséges** a csapdába bemászó rovarokat előlni. Külföldi tapasztalatok szerint jól bevált például, ha a csapda belsejét alaposan befújják háztartási rovarölő spray-jel (pl. empetrin, permetrin, deltametrin, stb. hatóanyaggal), és ezt a befújást 8-10 naponta megisméttlik. Ezekhez a csapdatípusainkhoz **alternatívaként** mellékelten küldünk hengeres ragacs betétet is, azoknak, akik számára valamilyen okból az ölöszt használata kényelmetlen.



Összeszerelési útmutató Hengeres ragacsbetét




1. Válassza szét a ragacslap párt (A)!

2-4. A tartó gyűrűbe (B) helyezze be a ragacslapot, úgy, hogy a RAGASZTÓS FELÜLET BEFELE nézzen!

5. Helyezze a kész hengeres ragacsbetét a KLP csapda fogóedényébe!

6. Helyezze rá a műanyag kúpot és állítsa össze a csapdát a szokásos módon!





Fotó: Tóth M.



Fotó: Tóth M.

© ATK NÖVI 2020

Így néz ki, ha a CSALOMON®
KLP+ csapda megfogta!

