

Conorrhynchus répabarkó - *Conorrhynchus* (*Cleonus*) *mendicus* Gyll.

A bogár 10-16 mm hosszú, 4-6 mm széles. Feje kissé megnyúlt, a barkókra jellemzően vaskos, ormánszerű. Alapszíne fekete, teste nagy részét szürke pikkelyek fedik. Potrohának hasi oldala világos színű, rajta több fekete folt díszleg. Nagyon hasonló a hazai lisztes répabarkóhoz (*Bothynoderes punctiventris*).

Tápnövénye: cukorrépa, takarmányrépa, valamint számos gyomnövény.

Kárképe: hasonlóan a lisztes répabarkóhoz, a bogár a levelek karéjozásával kezdi, majd tarra rágja a növényt. A lárva a répa gyökerén sekély, vályú alakú, hosszanti berágást okoz. Több lárva el is pusztíthatja a növényt.

A feromoncsapdát a talajra helyezzük ki, a tavalyi répatábla körüli gyomszegélybe, (ha célunk a legkorábbi



A bogár, amit a csapda fog



A lárva kártétele, amit meg kell előznünk

megjelenés detektálása), vagy az idei, kelő répatáblába, ill. gyomszegélybe, (ha célunk a bevonulás követése, ill. gyérítés). A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja március közepe (Olaszo., Emilia Romagna).

A CSALOMON® csapda szelektivitása (Olaszországi tapasztalatok alapján): a csapda hatóanyaga csak a *Conorrhynchus* répabarkót csalogatja. Keleteurópában a célfajon kívül hasonló jól fogja a lisztes répabarkót is.



Mivel talajcsapdáról van szó, a földön mászkáló élőlények (rovarok, pókok, esetleg csigák) véletlenszerűen a csapdába juthatnak. Célszerű a csapdát rendszeresen (legalább hetente) üríteni, mert az elpusztult rovarok bomlásakor

keletkező bűzanyagok - a szezon előrehaladtával - igen sok futó-, ill. dögbogarat (Carabidae, Silphidae) csalogathatnak a csapdába.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 6-8 hét. Ezután a csapdában a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Javasolt csapdatípus: TAL csapda, de a csalétkünk más, hagyományos talajcsapdáknál is használható. A fogás hatékonyabb, ha szabadforgalmú inszekticidet teszünk a csapdába.

A *Conorrhynchus* répabarkó hazánkban nem honos, legközelebb Olasz-, vagy Franciaországban, ill. még délebbre, Északafrikában találkozhatunk vele.

A csapdákkal más módszereknél érzékenyebben észlelhetjük a kártevő megjelenését területünkön, s követhetjük a rajzás menetét. A betelepülés iránya, a fertőzési gócok könnyen lokalizálhatók, majd felszámolhatók. A csapdákkal a bogarak gyérítése, így a bogárkár csökkentése is lehetséges; ehhez a lisztes répabarkón szerzett előzetes tapasztalatok alapján 15-30 csapda/ha szükséges.



az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>

*Conorrhynchus
mendicus*



Így néz ki, ha a CSALOMON® TAL csapda megfogta!



A CSALOMON® TAL csapdát könnyen elhelyezhetjük a talaj felszínén (nem szükséges beásni!), a felmászó rámpákra helyezett néhány talajrög helyben tartja a csapdát szeles időben is!

A megfogott bogarak könnyen eltávolíthatók a csapdából.
(A képen a fogás *Bothynoderes (Cleonus) punctiventris* bogaraktól áll.)

Ha szükséges, a csalétek hagyományos talajcsapdákkal is használható!

