

Repcebecőmoly - *Evergestis extimalis* Scop.

A lepke szárny-fesztávolsága 23-26 mm. A szárnyak alapszíne élénksárga, elülső szárnyának külső szegelyén barna sávval. Ez a sáv könnyűvé teszi a kukoricamolytól való megkülönböztetést.

A hernyó tápnövénye: repce, káposztafélék, továbbá más keresztesvirágú zöldség- és szántóföldi növények. Kárképe: a fiatal korokban sárgászöld, kifejlett korokban vörösbarna hernyók, melyek csoportosan élnek, összeszövik a repcevirágok becőit, rajtuk kerek lyukakat rágnak, a magot kirágják („furulyás becő”). A magnak természetesen retken és káposztán is hasonló kárt okoznak.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: a repcebecőmoly feromoncsapda jellemző szennyező faja az *Axylia putris* bagolylepke, amit eltérő testfelépítése és szárnymintázata alapján könnyen megkülönböztethetünk a célfajtól. Esetenként foghat a csapda néhány példányt egyes sodrómolyfajokból is, melyek a repcebecőmolynál jóval kisebbek.



alipo.web-log.nl



ghhfen.wikipedia.org

A lepke, amit a csapda fog



vc66.co.uk

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdában a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!



A javasolt VARL+ varsás csapda a populáció rajzásmenetét jobban követi, tömeges fogásra is alkalmas! Tapasztalat szerint a RAG csapda a fajt nem fogja kellő mértékben! A feromoncsapdát a vizsgált növénykultúra közelébe, a növényzet tetejének szintjére helyezjük ki. A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja május eleje.

A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk

Feromoncsapdáinkkal kiválóan észlelhető a lepkék megjelenése és követhető rajzásmenete. A repcebecőmoly hazánkban alkalmi kártevő. A feromoncsapda kiváló eszköz a helyi alkalmi felszaporodás időben való felfedezésére. Ha védekezésre szükség van, alkalmazza az engedélyezett növényvédőszerk valamelyikét! [1]

[1] Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu)

Ábra: RAG és VARL+ csapdák összehasonlítása repcebecőmolyok fogására. Összes fogás 184 db. (Tóth M., nem közölt)



az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>



A varsás CSALOMON®
VARL+ csapdák nagy
tömegben foghatják a
repcebecőmolyt, a telítődés
veszélye nélkül. Ennél a
fajnál a RAG típusú csapdák
nem voltak megfelelőek.

Foto: Jurkó V.

Így néz ki, ha a CSALOMON® VARL+ csapda megfogta!