

Kávéaknázómoly - *Perileucoptera (Leucoptera) coffeella* Guérin-Meneville

biblioteca...icafe.org



A lepke, amit a csapda fog

Csalogatóanyag: CF-PCOFF Hatáserősség: erős

A lepke hossza 2-3 mm, szárny-fesztávolsága 5-7 mm. Elülső szárnyai alapszíne fémesen ezüst-szürke, enyhén felpenderedő csúcsán sötét foltokkal. Hátsó szárnya keskeny, szürke. A moly alakja elég széles, zömök.

A hernyó tápnövénye: kávé (leginkább *arabica*-n károsít, de néha megtalálható *robusta*-n is). Kárképe: a lárva a levélben egyre nagyobbodó, végül 10-18 mm átmérőjű, szabálytalan alakú aknát készít, belsejében látható az ürülék sötét foltként. Az akna széle hólyagos. Amíg a hernyó az aknában él, az akna feletti epidermisz világos, távozását követően megsötétedik. Tömeges elszaporodás esetén a hernyók a kávécserejék lombfelületének nagy részét elpusztítják. Egy levélen 4 akna már levélhullást okozhat.



A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk



fmcagricola.com.


A csapdát 1 - 1,5 m magasra, lehetőleg lombos ágra akasszuk. Mivel a teljes életsiklus 3-4 hét alatt is végbemehet, régiótól függően a *P. coffeella* 9-12 nemzedéket is nevelhet. A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja: trópusi országban folyamatos.

A CSALOMON® csapda **szelektivitása**: más lepkefaj csak véletlenszerűen repül a csapdába (brazíliai vizsgálatok alapján).

A CSALOMON® csapda **vonzóképesége**: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! Ragacslapcsere: a fogástól függően, szükség szerint (általában 7-10 naponként).

A *P. coffeella* hazánkban NEM honos, megjelenése sem várható. A faj elsősorban a latinamerikai országok kávéültetvényeiben okoz kárt, jelen van még Madagaszkáron is. Az aknázómolyok túlszaporodását ellenségeik, az apróbb fürkészdarazsak gyakran megakadályozzák[1]. Ha azonban a fürkészdarazsak elpusztulnak (pl. inszekticides permetezés során), az aknázómolyok néhány hét alatt robbanásszerűen fől szaporodhatnak. A trópusi kávétermesztésben szokásos árnyékoló növényzet elpusztítása is a tapasztalat szerint a kávéaknázómoly tömeges felszaporodásához vezet[1]. Az ilyen felszaporodások idejében való észlelésére a feromoncsapdák kiválóan alkalmasak!

[1] <http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Datasheet.aspx?dsid=30486;>
<http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/85837/Lomeli-Flores.pdf>



A **Csalomon** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@agrar.mta.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>



Így néz ki a moly, amit
a CSALOMON® RAG
csapda fog!

