

# Repce-fénybogár - *Meligethes aeneus* Fabr.

Az apró bogár 1,5-2,7 mm hosszú. Színe sötétzöld, kék vagy zöld, fémesen fénylő. Lábai sötétek, kivéve az elülső párat, amely vörösesbarna. Az igen hasonló, a *Meligethes* nembe tartozó közeli rokonfajoktól az elülső lábszár eltrő fogazása, és más, csak szakértő számára értékelhető különbségek alapján különböztethető meg.

A lárva tápnövénye: repce, fehér vagy angol mustár, tarlórépa, káposztafélék, továbbá más keresztesvirágú növények. **Kárképe:** a bogár a bimbós állapotban levő repcevirágon a peterakás céljából a bimbóba oldalt berág, károsítva a virág generatív szerveit, majd az egész bimbó elszárad és lehull, a virágnyelek felkopaszodnak. A kinyílt virágokban elsősorban virágport fogyaszt. A kifejlett bogár a legkülönbözőbb virágokon táplálkozhat.



insektenfotos.de

**A bogár, amit a csapda fog**



stopa. csop.pl



aramel.free.fr



stopa. csop.pl

**A fő kárt a kifejlett bogár rágása okozza**



farm4.static.flickr.com



pbase.com

A csapdát a vizsgált növénykultúra közelébe, a talajra, vagy a növényzet tetejének szintjére helyezük ki. A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja **március eleje**. Ha célunk az áttelelő bogarak megjelenésének korai észlelése, annak a táblának a gyomszegélyébe célszerű a csapdát kihelyeznünk, ahol az **előző** évben volt repcetermesztés! Itt ugyanis az áttelelő populáció a gyomszegélyben felszaporodik, és megjelenésüket korábban, megbízhatóbban észlelhetjük! Amikor az áttelelő bogarak megjelennek csapdánkban, ez megadja betelepülésük időpontját is az idei repcetáblákba.

**A CSALOMON® csapda szelektivitása:** a csapda a repce-fénybogáron kívül fogja a más, kártevő *Meligethes*


fajokat (*M. coracinus*, *M. viridescens*, *M. picipes*, *M. nigrescens*) is. E fajok elkülönítéséhez magasfokú rendszertani ismeretek szükségesek. Mivel a csapda csalétke szintetikus virágillat-anyagokat tartalmaz, ezekre számos vadméh és poszméh faj is válaszol, különösen a koratavaszi időszakban. E hasznos rovarok csapdába esését megakadályozza a helyesen felszerelt „méhszűrő rácsocska”, melyet a csapdához **mellékelten** talál.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 3-4 hét. Ezután a csapdában a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra! A VARb3z+ módosított varsás csapda egyesíti azokat a **szín- és illatingereket**, melyek a repce-fénybogarat különösen erősen csalogatják. A csapda fogóedényébe jutott bogarakat célszerű előlni.

Csapdánkkal kiválóan észlelhető a bogarak koratavaszi **megjelenése** és követhető **rajzásmenete**. Ha szükség van védekezésre szigorúan csak az engedélyezett szereket vegye igénybe (méhkímélés!).[1]

Tapasztalat szerint a repce-fénybogár napsütésben gazdag, nem túl csapadékos tavasszal jeletkezik tömegesen. Száraz tavaszok után következő populációk általában kisebbek.[2]

[1] Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; [www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html](http://www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html); WIN-PESZTI ([www.relemi.hu](http://www.relemi.hu)). [2] Balázs K. és Jermy T, A növényvédelmi állattan kézikönyve 3A. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.



A **Csalomon** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.



Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <[csalomon@julia-nki.hu](mailto:csalomon@julia-nki.hu)> vagy <[h2371tot@ella.hu](mailto:h2371tot@ella.hu)>; internet: <[www.julia-nki.hu/csalomon](http://www.julia-nki.hu/csalomon)>

A KLP+, VARs+ és VARb3z+ csapdatípusoknál, **feltétlenül szükséges** a csapdába bemászó rovarokat előlni. Külföldi tapasztalatok szerint jól bevált például, ha a csapda belsejét alaposan befújják háztartási rovarölő spray-jel (pl. empetrin, permetrin, deltametrin, stb. hatóanyaggal), és ezt a befújást 8-10 naponta megismétlik. Ezekhez a csapdatípusainkhoz **alternatívaként** mellékelten küldünk hengeres ragacs betétet is, azoknak, akik számára valamilyen okból az ölöszer használata kényelmetlen.





## Összeszerelési útmutató Hengeres ragacsbetéthez



1. Válassza szét a ragacslap párt (A)!

2-4. A tartó gyűrűbe (B) helyezze be a ragacslapot, úgy, hogy a RAGASZTÓS FELÜLET BEFELE nézzen!

5. Helyezze a kész hengeres ragacsbetétet a csapda fogóedényébe és állítsa össze a csapdát a szokásos módon!



Táplálkozó repce-fénybogarak

## A "MÉHKISZŰRŐ RÁCSOCSKA" HASZNÁLATA

Olyan esetekben, amikor a szintetikus virágillatanyagot tartalmazó csalétek méheket, poszméheket is csalogat (pl. repce-fénybogár csapda), ezeknek a hasznos rovarfajoknak a fogása megakadályozható a "méhkiszűrő rácsocska" (a repce-fénybogár csapda része) használatával!





Így néz ki, ha a CSALOMON® VARb3z+ csapda megfogta!

Foto: Jurkó V.



VARb3z+ csapda

