

Sokpettyes virágbogár - *Oxythyrea funesta* Poda

Nagyjából téglalap alakú, 8-12 mm-es bogár, fekete színű, fémes, vöröses-zöldes csillogású testének felülete gyéren szőrözött. Az előtoron 3-3, ugyanitt, az oldalszegélyek mentén 2-3, a szárnyfedőkön sok, a farfedőn csak néhány világos folt található.

Tápnövénye: a bogár mindenféle gyümölcsfa (körte, őszibarack), szelídgesztenye, dísnövények (pl. pünkösdi rózsza) virágának elpusztításával okoz kárt. Gyakran károsít gabonafélék, elsősorban a rozs virágzó kalászaiban, de szívesen táplálkozik a keresztes és fészkesvirágú lágyszárú növényeken is. A bogár a porzókat, a szirmleveleket és a bibét megrágva meddővé teszi a virágot. Nem csak a kinyílt virágokat,

hanem a bimbókat is károsíthatja. A lárvá (pajor) talajlakó; korhadó növényi részekkel táplálkozik, kárt nem okoz.

A csapdát a gyümölcsösben az alsó ágakra, v. a törzs mellett a talaj szintjére, illetve a talajra, karóhoz rögzítve helyezzük ki. Rendkívül lényeges, hogy a csapda zöldessárga színű tölcsekes része a nap folyamán minél tovább kapjon napfényt; az árnyékos helyen a bogarak nem szívesen repülnek bele! A csapdázás megkezdésének időpontja május eleje, de mindenképpen célszerű a virágzás kezdete előtt néhány nappal!

A CSALOMON® csapda szelektivitása: csalétkünk virág illatanyag, mely az élénk zöldessárga szín csalogató hatását tovább fokozza. A sokpettyes virágbogáron kívül kis számban foghatja a hasonló megjelenésű, de sokkal szőrösebb bundásbogarat (*E. hirta*), a jóval nagyobb, csillogó zöldes fémfényű aranyos rózsabogarat (*Cetonia a. aurata*) és rezes virágbogarat (*Potosia cuprea*). Lucernás közelében lucernacincérek (*P. floralis*) is berepülhetnek. Ezek a fajok szintén okoznak károkat a virágok megrágásával, tehát befogásuk nem előnytelen. (A bundásbogár^[1], az aranyos és rezes virágbogarak^[2], ill. a lucernacincér^[3] fogására speciálisan célzott csapdák is kaphatók – ld. terméklistánkat!). Más rovarfaj berepülését eddig csak véletlenszerűen észleltük.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 3-4 hét után lassan csökkenhet. Ezután a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje frissre!



A bogár, amit a csapda fog

A sokpettyes virágbogár elleni védekezés az előrejelzésen kell hogy alapuljon. A csapdák alkalmazása sokkal egyszerűbb és kevésbé munkaigényes, mint az eddig szokásosan alkalmazott módszereké, viszont érzékenyen jelzik a kártevő megjelenését. Így a betelepülés iránya, a fertőzési gócok könnyen behatárolhatók, majd felszámolhatók. A nagy fogókapacitású **varsás** csapda típus nagyszámú bogarat képes befogni, tehát a kártevő **gyérítésére**, és a **kártétel szintjének csökkentésére** is alkalmas!

farm4.static.flickr.com




**A kártétel, amit
meg kell előznünk**

Ebből a szempontból előny, hogy csapdánk mind a hím és nőstény bogarat befogja. (A csapdába esett bogarak már bizonyosan nem fogják gyümölcsfáink virágait károsítani!) Igen erős kártételnél szükséges lehet egyéb védekezést is alkalmazni. Ez - a beporzó méhek kímélését figyelembe véve – csak az adott kultúrában engedélyezett szerrel, méhkímélő technológiával történhet^[4]. Ha a bogaraknak a peterakás céljára csalogató peterakóhelyeket készítünk (felásott talaj szalmaszecskaival keverve, növényi maradványokkal letakarva), a kikelő lárvák talajszekticidekkel elpusztíthatók^[4].



www.repentia.no-ip.com

A kártétel, amit meg kell előznünk



az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>.



sokpetty.virágb.
O. funesta

Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® VARb3z csapda megfogta!