

Selyemfényű puszpángmoly - *Cydalima perspectalis* Walk.

A lepke szárny-fesztávolsága 35-40 mm. A szárnyak alapszíne fehér, enyhén lilásan irizáló, a szárnyak fémesen csillogó barna szegéllyel. Előfordul azonban melanisztikus színváltozat is, ahol a szárnyak alapszíne barna. Mindkét esetben jellemző az első szárnyakon az elülső szegély közepe táján látható fehér, félhold alakú folt.



A lepke, amit a csapda fog

A hernyó tápnövénye: puszpáng (*Buxus*) fajok. Kárképe: a kikelő kis hernyók először a levelek felszínén hámozgatnak, majd később a leveleket teljesen elpusztítva a hajtásokat lekopaszítják. A károsítás eredményeképpen súlyos lombvesztés, tarrágás is gyakran bekövetkezhet. Ismétlődő károsítás a puszpáng bokrok teljes pusztulását okozhatja.

A CSALOMON® csapda szelektivitása: a selyemfényű puszpángmoly feromoncsapda eddigi hazai tapasztalataink szerint más lepkefajt nem fog jelentős számban. Néhol a gypottok-bagolylepke (*Helicoverpa armigera*) egyes



példányai kerülhetnek a csapdába, ezek nagyobbak, és színezetük eltér a puszpángmolyétól.

A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdában a csalétket a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!

A javasolt **VARL** varsás csapda a populáció rajzásmenetét jobban követi, tömeges fogásra is alkalmas! Tapasztalat szerint a ragacsos RAG csapda a fajt nem fogja kellő mértékben!^[4] A feromoncsapdát a

A lárva és kártétele, amit meg kell előznünk

bokrok, fák ágaira 1,0 – 1,5 m magasra helyezzük ki. A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja június eleje. Feromoncsapdáinkkal kiválóan észlelhető a lepkék megjelenése és követhető rajzásmenete. A selyemfényű puszpángmoly Európában – és így hazánkban is – nem őshonos kártevő, eredeti előfordulási területe Kelet-Ázsia. Magyarországon először 2010-ben észlelték, 2016-ig gyakorlatilag az egész ország területén megjelent^[1]. A feromoncsapda kiváló eszköz a helyi alkalmi felszaporodás időben való felfedezésére. Kis egyedszámú megjelenés esetén, kiskertekben a károsított növényi részek eltávolítása, a hernyók összegyűjtése és megsemmisítése hasznos lehet. Ha védekezésre szükség van, alkalmazza az engedélyezett növényvédőszerek valamelyikét!^[2] A permetezésre legalkalmasabb a tavaszi (áttelelésből előbúvó lárvák), ill. nyári (első lepkenemzedék által lerakott petékből fejlődő lárvák) időszak, A vegyszeres kezelések időzítéséhez jó támpontot ad a feromoncsapdák fogásainak alakulása.

^[1] Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, novenyvedoszer.nebih.gov.hu; WIN-PESZTI (www.relemi.hu). ^[2] Hill, D. (ed) *Agricultural Insect Pests of the Tropics and their Control*. Cambridge Univ. Press, 1975, 516 p.



A Csalomon az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: csalomon@agrar.mta.hu internet: www.csalomoncsapdak.hu



Foto: Tóth M.

A varsás CSALOMON®
VARL csapdák nagy
tömegben foghatják a
puszpángmolyt, a telítődés
veszélye nélkül. Ennél a
fajnál a RAG típusú csapdák
nem voltak megfelelőek.

Így néz ki, ha a CSALOMON® VARL csapda megfogta!