

Darázs fajok - *Vespa* spp.

A társas redősszárnyú darázs fajok teste sárga, fekete csíkokkal, foltokkal díszített. Potrohuk végén lévő fullánkjukkal érzékenyen szúrnak, amely komolyan veszélyeztetheti a megcsípett személy egészségét; a lódarázs (*Vespa crabro*) esetében halálos szúrást is feljegyeztek!

Az áttelelt nőstény tavasszal fészket épít, ahol a nyár elején megjelenő dolgozók fejlődnek, folyamatosan kelnek ki. Fajtól függően a fészkek néhány tucat, ill. sok tízezer dolgozót is nevelhetnek.

A darazsak általában ragadozók, de édes nedvekre is szükségük van, ezért az érett gyümölcsöket kikezdi, kirágja. Gazdasági kárt ezzel okoznak. Főként a szőlőt, körtét károsítják, de a szilvát, barackot, almát is. A darázscsaládok gyümölcséréskor érik el legnagyobb egyedszámukat. Hosszú, száraz ősz esetén magasabb kártétellel számolhatunk.

A csapdát 0,5 - 1,5 m magasan, v. talajszinten helyezjük el, föltétlenül **napos** helyen! A darazsak szívesen keresik fel a nap által jól sütött, kiálló ágakat, házsarkokat, míg árnyékban nemigen keresgélnek. A csapdázás megkezdésének javasolt időpontja **július eleje**, vagy amikor kellemetlenül fölszaporodnak a darazsak, (pl. gyümölcsérés idején.)

A CSALOMON® VARL darázscsapda alsó fogóedényébe öntsünk 0,2-0,3 liternyi az alábbi folyadékból (a fogóedényt tartó gumit feszítsük meg, nehogy a folyadék súlya a fogóedényt kifordítsa a csapdatest aljából!):

- 1 rész **sör** (jól bevált pl. a világos sörök)
- 1 rész **narancslé** (jól bevált pl. 100%-os rostos narancslé)
- 1 rész 2%-os **bórsav** oldat (készítése: 1 l meleg vízben oldott 20 g bórsav; patikában kapható).

A bórsavas oldat elhagyható; funkciója az, hogy a megfogott rovarok bomlását, a kellemetlen, rothadó szagok fejlődését csökkentse; a fogásra nincs befolyással.

A fenti keverék már maga is jól csalogatja a darazsakat. Ha CSALOMON® rásegítő csalétket is teszünk a csapdába (szokásos módon a csapdatetőhöz rögzítve), a fogást jelentősen megnövelhetjük. A rásegítő csalétek szabadföldön 4-6 hét elmúltával fokozatosan elveszti hatását, ilyenkor célszerű frissre cserélni!



V. germanica és V. crabro



A darázs kártétele, amit meg kell előznünk

Rásegítő csalétkünk elsősorban a kecskedarazsat (*Vespa vulgaris*), a német darazsat (*V. germanica*) és a lódarazsat (*V. crabro*) csalogatja, a papírdarazsakra (*Polistes spp.*) azonban nincs hatással. Egyáltalán NEM csalogatja a háziméhet (*Apis mellifera*). A csalétek a húslegyek (*Sarcophagidae*) számos képviselőjét is vonzza, a házilegyet (*Musca domestica*) nem. A sör/narancslé keverék illata a darazsakon kívül egyéb lepke és más rovarfajt is csalogathat, melyek között sok kártevő akad; ezek megfogása előnyösnek bizonyulhat!

www.delivery.superstock.com



www.countrywide-pestcontrol.co.uk

**A darázs kártétele, amit
meg kell előznünk**



A csapdák használatával gyéríthejük a kellemetlenkedő darazsakat kertünkben, gyümölcsösünkben. Az értékesebb gyümölcsöket emellett zacskózással is megvédhetjük. Még célravezetőbb, ha felderítjük a közeli darázfészkeket és este, amikor a darazsak visszavonulnak, elpusztítjuk őket. Több csapdát hálószerűen kihelyezve a fogások összehasonlításával meghatározhatjuk a darázfészkek irányát, helyét. Gyérítésre a legjobb módszer, ha a csapdát késő őszig (november) ill. koratavasszal (márciustól) folyamatosan üzemeltetjük, mert ekkor a fészkekalapító nőstényeket tudjuk befogni, aminek eredményeképpen környékünkön kevesebb lesz a darázfészkek.



A **CsalomN** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@agrar.mta.hu>; internet: www.csalomoncsapdak.hu

Így helyezze a
darázs rásegítő
csalétket a VARL
csapdába!





német darázs
V. germanica



lódarázs
V. crabro



Így néz ki, ha a CSALOMON®
VARL csapda megfogta!